

LINHA
**MINERAL
PHÓS**



*NUTRIÇÃO DE QUALIDADE,
PARA RESULTADO DE PESO.*

www.agrovieiro.com.br

PHÓS 88

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para bovino de corte das categorias cria, recria e engorda em regiões de solo de baixa fertilidade ou pastagens de braquiária ou similares.

MODO DE USAR

Fornecer puro a vontade, de preferência em cochos cobertos. Estima-se consumo aproximado de 120 g de produto/animal/dia.

NÍVEIS DE GARANTIA

FÓSFORO(MÍN.)	88,0 G/KG
CALCIO(MÍN.)	170,0 G/KG
CALCIO(MÁX.)	200,0 G/KG
SÓDIO(MÍN.)	93,0 G/KG
ENXOFRE(MÍN.)	13,0 G/KG
MAGNÉSIO(MÍN.)	2000,0 MG/KG
ZINCO(MÍN.)	4103,0 MG/KG
COBRE(MÍN.)	1510,0 MG/KG
MANGANÊS(MÍN.)	580,0 MG/KG
COBALTO(MÍN.)	60,0 MG/KG
IODO(MÍN.)	49,0 MG/KG
SELÊNIO(MÍN.)	22,0 MG/KG
FERRO(MÍN.)	250,0 MG/KG
FLÚOR(MÁX.)	900,0 MG/KG



PHÓS 66

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para bovino de corte das categorias recria e engorda em regiões de solo de baixa fertilidade ou pastagens de braquiária ou similares.

MODO DE USAR

Fornecer puro a vontade, de preferência em cochos cobertos. Estima-se consumo aproximado de 100 g de produto/animal/dia.

NÍVEIS DE GARANTIA

FÓSFORO(MÍN.)	66 G/KG
CALCIO(MÍN.)	180,0 G/KG
CALCIO(MÁX.)	220,0 G/KG
SÓDIO (MIN)	103 G/KG
ENXOFRE (MIN)	10 G/KG
ZINCO(MÍN.)	3006 MG/KG
COBRE (MIN)	1100 MG/KG
MANGANÊS (MIN)	525 MG/KG
COBALTO (MIN)	34 MG/KG
IODO (MIN)	43 MG/KG
SELÊNIO (MIN)	18 MG/KG
FLÚOR(MÁX.)	700 MG/KG



PHÓS 44

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para bovino de corte da categoria engorda em regiões de solo de baixa fertilidade ou pastagens de braquiária ou similares.

MODO DE USAR

Fornecer puro a vontade, de preferência em cochos cobertos. Estima-se consumo aproximado de 85 g de produto/animal/dia.

NÍVEIS DE GARANTIA

FÓSFORO(MÍN.)	44,0 G/KG
CALCIO(MÍN.)	170,0 G/KG
CALCIO(MÁX.)	220,0 G/KG
SÓDIO(MÍN.)	115,0 G/KG
ENXOFRE(MÍN.)	12,0 G/KG
ZINCO(MÍN.)	2604,0 MG/KG
COBRE(MÍN.)	1100,0 MG/KG
MANGANÊS(MÍN.)	100,0 MG/KG
COBALTO(MÍN.)	34,0 MG/KG
IODO(MÍN.)	43,0 MG/KG
SELÊNIO(MÍN.)	18,0 MG/KG
FLÚOR(MÁX.)	500,0 MG/KG



PHÓS REPRODUÇÃO

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para bovino de corte da categoria cria, vaca em estação de monta ou em programa de inseminação em sistema de alimentação a pasto.

MODO DE USAR

Fornecer puro a vontade, de preferência em cochos cobertos. Estima-se consumo aproximado de 120 g de produto/animal/dia.

NÍVEIS DE GARANTIA

FÓSFORO(MÍN.)	90,0 G/KG
CALCIO(MÍN.)	180,0 G/KG
CALCIO(MÁX.)	220,0 G/KG
SÓDIO(MÍN.)	80,0 G/KG
ENXOFRE(MÍN.)	12,0 G/KG
MAGNÉSIO (MÍN.)	950,0 MG/KG
ZINCO(MÍN.)	4440,0 MG/KG
COBRE (MÍN.)	1120,0 MG/KG
MANGANÊS	950,0 MG/KG
COBALTO (MÍN.)	40,0 MG/KG
IODO(MÍN.)	40,0 MG/KG
SELÊNIO(MÍN.)	24,0 MG/KG
FLÚOR(MÁX.)	1000,0 MG/KG



PHÓS LEITE

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para bovino de leite em lactação.

MODO DE USAR

Fornecer puro a vontade, de preferência em cochos cobertos. Estima-se consumo aproximado de 110 g/animal/dia. Para vacas com produção de leite acima de 15 kg recomenda-se misturar na ração 100-150 g do produto/vaca.

NÍVEIS DE GARANTIA

FÓSFORO(MÍN.)	85,0 G/KG
CALCIO(MÍN.)	210,0 G/KG
CALCIO(MÁX.)	235,0 G/KG
SÓDIO(MÍN.)	60,0 G/KG
ENXOFRE(MÍN.)	21,0 G/KG
MAGNÉSIO(MÍN.)	6000,0 MG/KG
ZINCO(MÍN.)	3000,0 MG/KG
COBRE(MÍN.)	800,0 MG/KG
MANGANÊS(MÍN.)	1000,0 MG/KG
COBALTO(MÍN.)	40,0 MG/KG
IODO(MÍN.)	40,0 MG/KG
SELÊNIO(MÁX.)	20,0 MG/KG
FERRO (MÍN)	1000,0 MG/KG
FLÚOR (MAX)	900,0 MG/KG
AROMA DE LEITE	25,0 MG/KG



PHÓS CROMO

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para bovino de corte das categorias recria (desmama) e engorda em sistemas de alimentação a pasto.

MODO DE USAR

ornecer puro a vontade, de preferência em cochos cobertos. Estima-se consumo aproximado de 100 g de produto/animal/dia.

NÍVEIS DE GARANTIA

FÓSFORO(MÍN.)	60,0 G/KG
CALCIO(MÍN.)	195,0 G/KG
CALCIO(MÁX.)	220,0 G/KG
SÓDIO(MÍN.)	93,0 G/KG
ENXOFRE(MÍN.)	10,0 G/KG
MAGNÉSIO(MÍN.)	1000,0 MG/KG
ZINCO(MÍN.)	2060,0 MG/KG
COBRE(MÍN.)	610,0 MG/KG
MANGANÊS(MÍN.)	250,0 MG/KG
COBALTO(MÍN.)	30,0 MG/KG
IODO(MÍN.)	20,0 MG/KG
SELÊNIO(MÁX.)	9,0 MG/KG
CROMO (MÍN.)	10,0 MG/KG
FLÚOR (MAX)	700,0 MG/KG

